

欧铂佳悠佳婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 100g

营养成分表			
项目 Items	单位 Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2072
蛋白质 Protein	克(g)	0.51	10.50
脂肪 Fat	克(g)	1.21	25.00
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.20	4.20
α-亚麻酸 α-Linolenic Acid	毫克(mg)	20	420
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.7	56.5
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μg)	18	380
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.63	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.29	6.00
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.69	35.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	19	400
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	24	500
维生素B ₃ Vitamin B ₃	微克(μg)	15.4	320.0
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	0.048	1.000
烟酸(Niacin)	微克(μg)	116	2400
叶酸 Folic Acid	微克(μg)	3.9	80.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μg)	135	2800
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	3.4	70.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.58	12.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.3	130.0
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	9	184
钾 Potassium	毫克(mg)	21	440
铜 Copper	微克(μg)	17.9	370.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.7	35.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.50
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.20
锰 Manganese	微克(μg)	2.17	45.00
钙 Calcium	毫克(mg)	15	315
磷 Phosphorus	毫克(mg)	12	240
碘 Iodine	微克(μg)	4.6	95.0
氯 Chloride	毫克(mg)	15	320
硒 Selenium	微克(μg)	0.92	19.00
可选择成分 Optional Components			
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	3.9	80.0
二十碳四烯酸ARA	毫克(mg)	4.8	100.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.017	0.350
低聚果糖FOS	克(g)	0.031	0.650
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.154	3.200
叶黄素Lutein	微克(μg)	3.0	63.0

每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表	
高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K ₁ (植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₃ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₆ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠)	

企业信息	
生产商:	天津嘉仕莱乳业有限公司
地址:	天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:	天津市
电话/传真:	022-58099599
经销商:	湖南欧铂佳食品有限公司
地址:	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场5.6栋3603、3604
网址:	www.oubotjia.net
电话:	0731-84220506
客服热线:	400-003-0506
保质期:	24个月
产品类别及属性:	乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:	GB 10765-2021
食品生产许可证编号:	SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)	

欧铂佳悠佳 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



国食注字YP20230182 净含量: 100g

优萃佳

贮存条件

- 开罐前: 1、请常温避光保存, 避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后: 1、请将盖子盖紧, 并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

食用方法



- 1、将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 2、将饮用水煮沸5分钟, 然后参照喂哺建议表, 选出所需水量及奶粉量;
- 3、待开水冷却至45℃-55℃, 将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入到奶瓶或奶杯中, 量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5、盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温度适中(将奶液滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度), 方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

注: 每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
• 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
• 喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。
过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。



爱护环境
人人有责



6 975413 970223

欧铂佳悠佳婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 330g

营养成分表			
项目 Items	单位 Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2072
蛋白质 Protein	克(g)	0.51	10.50
脂肪 Fat	克(g)	1.21	25.00
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.20	4.20
α-亚麻酸 α-Linolenic Acid	毫克(mg)	20	420
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.7	56.5
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μg)	18	380
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.63	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.29	6.00
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.69	35.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	19	400
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	24	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	15.4	320.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.048	1.000
烟酸(Niacin)	微克(μg)	116	2400
叶酸 Folic Acid	微克(μg)	3.9	80.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μg)	135	2800
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	3.4	70.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.58	12.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.3	130.0
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	9	184
钾 Potassium	毫克(mg)	21	440
铜 Copper	微克(μg)	17.9	370.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.7	35.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.50
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.20
锰 Manganese	微克(μg)	2.17	45.00
钙 Calcium	毫克(mg)	15	315
磷 Phosphorus	毫克(mg)	12	240
碘 Iodine	微克(μg)	4.6	95.0
氯 Chloride	毫克(mg)	15	320
硒 Selenium	微克(μg)	0.92	19.00
可选择成分 Optional Components			
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	3.9	80.0
二十碳四烯酸ARA	毫克(mg)	4.8	100.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.017	0.350
低聚果糖FOS	克(g)	0.031	0.650
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.154	3.200
叶黄素 Lutein	微克(μg)	3.0	63.0

每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

开罐前: 1、请常温避光保存, 避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后: 1、请将盖子盖紧, 并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物油调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素(维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育醇)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱))、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠)

企业信息

生产商: 天津喜仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
电话/传真: 022-58099599
销售商: 湖南优优食品有限公司
地址: 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号
绿地时代广场5、6栋3603、3604
网址: www.oubojia.net
电话: 0731-84220506
客服热线: 400-003-0506
保质期: 24个月
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号: GB 10765-2021
食品生产许可证编号: SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

欧铂佳悠佳

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



国食注字YP20230182 净含量: 330g

优萃佳®

食用方法



- 1、将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 2、将饮用水煮沸5分钟, 然后参照喂哺建议表, 选出所需水量及奶粉量;
- 3、待开水冷却至45℃~55℃, 将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入到奶瓶或奶杯中, 量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5、盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温度适中(将奶液滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度), 方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

注: 每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
 - 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
 - 喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。
- 过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。



爱护环境
人人有责



6 975413 970254

欧铂佳悠佳婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 800g

营养成分表			
项目 Items	单位 Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2072
蛋白质 Protein	克(g)	0.51	10.50
脂肪 Fat	克(g)	1.21	25.00
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.20	4.20
α-亚麻酸 α-Linolenic Acid	毫克(mg)	20	420
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.7	56.5
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μg RE)	18	380
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.63	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg α-TE)	0.29	6.00
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.69	35.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	19	400
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	24	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	15.4	320.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.048	1.000
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	116	2400
叶酸 Folic Acid	微克(μg)	3.9	80.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μg)	135	2800
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	3.4	70.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.58	12.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.3	130.0
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	9	184
钾 Potassium	毫克(mg)	21	440
铜 Copper	微克(μg)	17.9	370.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.7	35.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.50
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.20
锰 Manganese	微克(μg)	2.17	45.00
钙 Calcium	毫克(mg)	15	315
磷 Phosphorus	毫克(mg)	12	240
碘 Iodine	微克(μg)	4.6	95.0
氯 Chloride	毫克(mg)	15	320
硒 Selenium	微克(μg)	0.92	19.00
可选择成分 Optional Components			
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.9	80.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.8	100.0
低聚半乳糖 FOS	克(g)	0.017	0.350
低聚果糖 GOS	克(g)	0.031	0.650
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.154	3.200
叶黄素 Lutein	微克(μg)	3.0	63.0

每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

开罐前：1、请常温避光保存，避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后：1、请将盖子盖紧，并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠)

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地：天津市
电话/传真：022-58099599
销售商：湖南萍优食品有限公司
地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号
绿地时代广场5、6栋3603、3604
网址：www.oubotia.net
电话：0731-84220506
客服热线：400-003-0506
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

优萃佳®

欧铂佳悠佳
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



国食注字YP20230182 净含量: 800g

食用方法



- 1、将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- 2、将饮用水煮沸5分钟，然后参照喂哺建议表，选出所需水量及奶粉量；
- 3、待开水冷却至45℃-55℃，将正确水量倒入奶瓶或奶杯中；
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入至奶瓶或奶杯中，量取奶粉时请勿刻意压平；
- 5、盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用杯冲调，可用搅拌法搅匀，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

注：每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

• 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调，不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。

• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。

• 喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨

询医护人员酌情增减。

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。



欧铂佳悠佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 100g

营养成分表			
项目 Items	单位 Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2026
蛋白质 Protein	克(g)	0.62	12.50
脂肪 Fat	克(g)	1.14	23.00
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.14	2.90
α-亚麻酸 α-Linolenic Acid	毫克(mg)	14	290
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.8	56.0
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μg)	21	420
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.64	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.20	4.00
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.58	32.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	18	360
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	25	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	15.8	320.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.059	1.200
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	158	3200
叶酸 Folic Acid	微克(μg)	3.2	65.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μg)	123	2500
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	3.2	65.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.69	14.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.4	130.0
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	8	160
钾 Potassium	毫克(mg)	22	450
铜 Copper	微克(μg)	12.3	250.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	2.0	40.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.31	6.20
锌 Zinc	毫克(mg)	0.16	3.20
锰 Manganese	微克(μg)	0.99	20.00
钙 Calcium	毫克(mg)	21	420
磷 Phosphorus	毫克(mg)	14	280
碘 Iodine	微克(μg)	4.4	90.0
氯 Chloride	毫克(mg)	15	310
硒 Selenium	微克(μg)	0.59	12.00
可选择成分 Optional Components			
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.9	80.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.9	100.0
低聚半乳糖 GOS	克(g)	0.017	0.350
低聚果糖 FOS	克(g)	0.047	0.960
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.148	3.000
叶黄素 Lutein	微克(μg)	10.4	210.0

每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表	
高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K ₁ (植甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠)	
企业信息	
生产商: 天津喜仕莱乳业有限公司 地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区 产地: 天津市 电话/传真: 022-58099599 销售商: 湖南优食品有限公司 地址: 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场5.6栋3603、3604 网址: www.oubojia.net 电话: 0731-84220506 客服热线: 400-003-0506 保质期: 24个月 产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品 产品标准代号: GB 10766-2021 食品生产许可证编号: SC10512011617567 生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)	



国食注字YP20230183 净含量: 100g

优萃佳®

贮存条件

- 开罐前: 1、请常温避光保存, 避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后: 1、请将盖子盖紧, 并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

食用方法



- 1、将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 2、将饮用水煮沸5分钟, 然后参照喂哺建议表, 选出所需水量及奶粉量;
- 3、待开水冷却至45°C-55°C, 将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入到奶瓶或奶杯中, 量取奶粉时请勿刻意压实;
- 5、盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温度适中(将奶液滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度), 方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天限哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

注: 每一平匙乳粉约为4.5克。

爱心提示

- 6个月以上的较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。
• 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
• 喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。
过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。



爱护环境
人人有责



欧铂佳悠佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 330g

营养成分表			
项目 Items	单位 Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2026
蛋白质 Protein	克(g)	0.62	12.50
脂肪 Fat	克(g)	1.14	23.00
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.14	2.90
α-亚麻酸 α-Linolenic Acid	毫克(mg)	14	290
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.8	56.0
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μg)	21	420
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.64	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.20	4.00
维生素K Vitamin K ₁	微克(μg)	1.58	32.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	18	360
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	25	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	15.8	320.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.059	1.200
烟酰胺(Niacin)	微克(μg)	158	3200
叶酸 Folic Acid	微克(μg)	3.2	65.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μg)	123	2500
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	3.2	65.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.69	14.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.4	130.0
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	8	160
钾 Potassium	毫克(mg)	22	450
铜 Copper	微克(μg)	12.3	250.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	2.0	40.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.31	6.20
锌 Zinc	毫克(mg)	0.16	3.20
锰 Manganese	微克(μg)	0.99	20.00
钙 Calcium	毫克(mg)	21	420
磷 Phosphorus	毫克(mg)	14	280
碘 Iodine	微克(μg)	4.4	90.0
氯 Chloride	毫克(mg)	15	310
硒 Selenium	微克(μg)	0.59	12.00
可选成分 Optional Components			
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	3.9	80.0
二十碳四烯酸ARA	毫克(mg)	4.9	100.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.017	0.350
低聚果糖FOS	克(g)	0.047	0.960
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.148	3.000
叶黄素 Lutein	微克(μg)	10.4	210.0

每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

开罐前: 1、请常避光保存, 避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后: 1、请将盖子盖紧, 并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素(维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱))、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硝酸钠)

企业信息

生产商: 天津嘉仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区) 中环西路408号B区
产地: 天津市
电话/传真: 022-58099599
销售商: 湖南优优食品有限公司
地址: 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号
绿地时代广场5、6栋3603、3604
网址: www.oubotjia.net
电话: 0731-84220506
客服热线: 400-003-0506
保质期: 24个月
产品类型及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号: GB 10766-2021
食品生产许可证编号: SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)



国食注字YP20230183 净含量: 330g

优萃佳

食用方法



- 1、将奶瓶或奶嘴、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 2、将饮用水煮沸5分钟, 然后参照喂哺建议表, 选出所需水量及奶粉量;
- 3、将开水冷却至45℃~55℃, 将正确水量倒入奶瓶或奶嘴中;
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入到奶瓶或奶嘴中, 量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5、盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温度适中(将奶液滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度), 方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

注: 每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

6个月以上的较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食。

• 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。

• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。

• 喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据宝宝的生长情况咨询医护人员酌情增减。

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。



欧铂佳悠佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 800g

营养成分表			
项目Items	单位Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2026
蛋白质 Protein	克(g)	0.62	12.50
脂肪 Fat	克(g)	1.14	23.00
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.14	2.90
α -亚麻酸 α -Linolenic Acid	毫克(mg)	14	290
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.8	56.0
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μ g)	21	420
维生素D Vitamin D	微克(μ g)	0.64	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.20	4.00
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μ g)	1.58	32.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μ g)	18	360
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μ g)	25	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μ g)	15.8	320.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μ g)	0.059	1.200
烟酸/烟酰胺 Niacin	微克(μ g)	158	3200
叶酸 Folic Acid	微克(μ g)	3.2	65.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μ g)	123	2500
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	3.2	65.0
生物素 Biotin	微克(μ g)	0.89	14.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.4	130.0
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	8	160
钾 Potassium	毫克(mg)	22	450
铜 Copper	微克(μ g)	12.3	250.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	2.0	40.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.31	6.20
锌 Zinc	毫克(mg)	0.16	3.20
锰 Manganese	微克(μ g)	0.99	20.00
钙 Calcium	毫克(mg)	21	420
磷 Phosphorus	毫克(mg)	14	280
碘 Iodine	微克(μ g)	4.4	90.0
氯 Chloride	毫克(mg)	15	310
硒 Selenium	微克(μ g)	0.59	12.00
可选成分 Optional Components			
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	3.9	80.0
二十碳五烯酸ARA	毫克(mg)	4.9	100.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.017	0.350
低聚果糖FOS	克(g)	0.047	0.960
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.148	3.000
叶黄素Lutein	微克(μ g)	10.4	210.0

每100mL原液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件
开罐前：1、请常温避光保存，避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后：1、请密封盖于阴凉处，并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

配料表
高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物油和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素D(维生素A(视黄醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸胆碱))、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠)

企业信息
生产商：天津喜仕来乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
电话/传真：022-58098599
产地：天津市
经销商：湖南优佳食品有限公司
地址：湖南省长沙市岳麓区望岳街道银杉路31号
绿地时代广场5、6栋3603、3604
网址：www.oubojia.net
电话：0731-84220606
客服热线：400-003-0506
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基脱盐较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

欧铂佳悠佳 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



净含量: 800g

优萃佳®

食用方法



- 1、将奶瓶或奶嘴、奶嘴及奶瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后晾干直至使用时；
- 2、将饮用水煮沸5分钟，然后参照哺喂建议表，选出所需水量及奶粉量；
- 3、待开水冷却至45℃-55℃，将正确水量倒入奶瓶或奶杯中；
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中，量取奶粉时请勿刻意压平；
- 5、盖紧奶瓶，然后摇匀。如果用杯冲调，可用搅拌法搅匀，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

哺喂建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天哺喂次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

注：每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

6个月以上的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

• 请参照哺喂建议表的冲调比例进行冲调，不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。

• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。

• 哺喂建议表是推荐哺喂量，可根据婴幼儿的生长情况咨

询医护人员酌情增减。

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。



欧铂佳悠佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 100g

营养成分表			
项目 Items	单位 Unit	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2005
蛋白质 Protein	克(g)	0.67	13.50
脂肪 Fat	克(g)	1.12	22.50
亚油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.13	2.60
α-亚麻酸 α-Linolenic Acid	毫克(mg)	12	250
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.7	54.5
维生素 Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μg)	22	450
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.65	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.22	4.50
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.60	32.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	17	350
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	25	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	17.5	350.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.060	1.200
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	160	3200
叶酸 Folic Acid	微克(μg)	3.2	65.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μg)	140	2800
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	2.6	52.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.70	14.00
矿物质 Mineral			
钠 Sodium	毫克(mg)	8	160
钾 Potassium	毫克(mg)	22	450
铜 Copper	微克(μg)	12.5	250.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	2.0	40.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.31	6.20
锌 Zinc	毫克(mg)	0.14	2.80
钙 Calcium	毫克(mg)	22	450
磷 Phosphorus	毫克(mg)	15	300
碘 Iodine	微克(μg)	1.7	35.0
氯 Chloride	毫克(mg)	16	320
可选择成分 Optional Components			
硒 Selenium	微克(μg)	0.60	12.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.5	130.0
锰 Manganese	微克(μg)	1.00	20.00
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	2.7	55.0
二十碳四烯酸ARA	毫克(mg)	3.5	70.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.032	0.650
低聚果糖FOS	克(g)	0.072	1.450
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.150	3.000
叶黄素Lutein	微克(μg)	10.5	210.0

每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表	
高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K ₁ (植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质[硫酸铜、焦磷酸铁、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠]	

企业信息
 生产商: 天津嘉仕莱乳业有限公司
 地址: 天津自贸试验区(空港经济区) 中环西路408号B区
 产地: 天津市
 电话/传真: 022-58099599
 销售商: 湖南高优食品有限公司
 地址: 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场5、6栋3603、3604
 网址: www.ouboljia.net
 电话: 0731-84220506
 客服热线: 400-003-0506
 保质期: 24个月
 产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 产品标准代号: GB 10767-2021
 食品生产许可证编号: SC10512011617567
 生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

欧铂佳悠佳

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)



国食字YP20230184 净含量: 100g

优萃佳®

贮存条件

- 开罐前: 1、请常温避光保存, 避免长期处于高温下。
 2、请在保质期内使用本产品。
 开罐后: 1、请将盖子盖紧, 并放置于阴凉干燥处。
 2、请于一个月内将本产品食用完毕。

食用方法



- 1、将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 2、将饮用水煮沸5分钟, 然后参照喂哺建议表, 选出所需水量及奶粉量;
- 3、待开水冷却至45℃-55℃, 将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入到奶瓶或奶杯中, 量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5、盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温度适中(将奶液滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度), 方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

注: 每一平匙乳粉约为4.5克。

爱心提示

- 12个月以上的幼儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。
 • 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
 • 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
 • 喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。
 过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。



爱护环境 人人有责



6 975413 970247

欧铂佳悠佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 330g

营养成分表			
项目Items	单位Unit	每100kJ	每100g
能量Energy	千焦(kJ)	100	2005
蛋白质Protein	克(g)	0.67	13.50
脂肪Fat	克(g)	1.12	22.50
亚油酸Linoleic Acid	克(g)	0.13	2.60
α -亚麻酸 α -Linolenic Acid	毫克(mg)	12	250
碳水化合物Carbohydrate	克(g)	2.7	54.5
维生素Vitamin			
维生素A Vitamin A	微克(μ g)	22	450
维生素D Vitamin D	微克(μ g)	0.65	13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.22	4.50
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μ g)	1.60	32.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μ g)	17	350
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μ g)	25	500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μ g)	17.5	350.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μ g)	0.060	1.200
烟酸(烟酰胺) Niacin	毫克(mg)	160	3200
叶酸Folic Acid	微克(μ g)	3.2	65.0
泛酸Pantothenic Acid	毫克(mg)	140	2800
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	2.6	52.0
生物素Biotin	微克(μ g)	0.70	14.00
矿物质Mineral			
钠Sodium	毫克(mg)	8	160
钾Potassium	毫克(mg)	22	450
铜Copper	微克(μ g)	12.5	250.0
镁Magnesium	毫克(mg)	2.0	40.0
铁Iron	毫克(mg)	0.31	6.20
锌Zinc	毫克(mg)	0.14	2.80
钙Calcium	毫克(mg)	22	450
磷Phosphorus	毫克(mg)	15	300
碘Iodine	微克(μ g)	1.7	35.0
氯Chloride	毫克(mg)	16	320
可选择成分Optional Components			
硒Selenium	微克(μ g)	0.60	12.00
胆碱Choline	毫克(mg)	6.5	130.0
锰Manganese	微克(μ g)	1.00	20.00
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	2.7	55.0
二十碳四烯酸ARA	毫克(mg)	3.5	70.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.032	0.650
低聚果糖FOS	克(g)	0.072	1.450
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.150	3.000
叶黄素Lutein	微克(μ g)	10.5	210.0

每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

- 开罐前: 1、请常避光保存, 避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后: 1、请将盖子盖紧, 并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物油和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素[维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸胆碱)]、矿物质[硫酸铜、焦磷酸铁、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠]

企业信息

生产商: 天津嘉仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
电话/传真: 022-58099599
销售商: 湖南润优食品有限公司
地址: 湖南省长沙市岳麓区枫林街道银杉路31号
绿地时代广场5、6栋3603、3604
网址: www.oubojia.net
电话: 0731-84220506
客服热线: 400-003-0606
保质期: 24个月
产品类别及属性: 乳基脱盐幼儿配方食品
产品标准代号: GB 10767-2021
食品生产许可证编号: SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底二维码)

优萃佳®

欧铂佳悠佳 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)



国食注字YP20230184 净含量:330g

食用方法



- 1、将奶瓶或奶嘴、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 2、将饮用水煮沸5分钟, 然后参照喂哺建议表, 选出所需水量及奶粉量;
- 3、待开水冷却至45℃-55℃, 将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入奶杯或奶杯中, 量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5、盖紧奶嘴, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温度适中(将奶液滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度), 方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

注: 每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

12个月以上的幼儿食用本产品时, 须配合添加辅食。

• 请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。

• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。

• 喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据宝宝的生长情况咨询医护人员酌情增减。

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。



欧铂佳悠佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 800g

营养成分表		
项目Items	单位Unit	每100g/每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100 2005
蛋白质 Protein	克(g)	0.67 13.50
脂肪 Fat	克(g)	1.12 22.50
豆油酸 Linoleic Acid	克(g)	0.13 2.60
α -亚麻酸 α -Linolenic Acid	毫克(mg)	12 250
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.7 54.5
维生素Vitamin		
维生素A Vitamin A	微克(μ g)	22 450
维生素D Vitamin D	微克(μ g)	0.65 13.00
维生素E Vitamin E	毫克(mg)	0.22 4.50
维生素K Vitamin K	微克(μ g)	1.60 32.00
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μ g)	17 350
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μ g)	25 500
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μ g)	17.5 350.0
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μ g)	0.060 1.200
烟酸/烟酰胺 Niacin	微克(μ g)	160 3200
叶酸 Folic Acid	微克(μ g)	3.2 65.0
泛酸 Pantothenic Acid	微克(μ g)	140 2800
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	2.6 52.0
生物素 Biotin	微克(μ g)	0.70 14.00
矿物质Mineral		
钠 Sodium	毫克(mg)	8 160
钾 Potassium	毫克(mg)	22 450
铜 Copper	微克(μ g)	12.5 250.0
镁 Magnesium	毫克(mg)	2.0 40.0
铁 Iron	毫克(mg)	0.31 6.20
锌 Zinc	毫克(mg)	0.14 2.80
钙 Calcium	毫克(mg)	22 450
磷 Phosphorus	毫克(mg)	15 300
碘 Iodine	微克(μ g)	1.7 35.0
氯 Chloride	毫克(mg)	16 320
可选成分Optional Components		
硒 Selenium	微克(μ g)	0.60 12.00
胆碱 Choline	毫克(mg)	6.5 130.0
锰 Manganese	微克(μ g)	1.00 20.00
二十二碳六烯酸DHA	毫克(mg)	2.7 55.0
二十碳四烯酸ARA	毫克(mg)	3.5 70.0
低聚半乳糖GOS	克(g)	0.032 0.650
低聚果糖FOS	克(g)	0.072 1.450
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.150 3.000
叶黄素Lutein	微克(μ g)	10.5 210.0

每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

开罐前：1、请常温避光保存，避免长期处于高温下。
2、请在保质期内使用本产品。
开罐后：1、请将盖子盖紧，并放置于阴凉干燥处。
2、请于一个月内将本产品食用完毕。

配料表

真奶脱盐干乳清粉[脱盐干乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物油和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K、植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、生物素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱[酒石酸氢胆碱]]、矿物质[硫酸铜、焦磷酸铁、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、磷酸锰、磷酸钾、亚硫酸钠]

企业信息

生产商：天津嘉佳乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地：天津市
电话/传真：022-58099599
销售商：湖南优食食品有限公司
地址：湖南省长沙市岳麓区望岳路街道银杉路31号
绿地时代广场5、6栋3603、3604
网址：www.oubojia.net
电话：0731-84220506
客服热线：400-003-0506
保质期：24个月
产品类型及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

欧铂佳悠佳 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)



净含量: 800g

优萃佳

食用方法



- 1、将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- 2、将饮用水煮沸5分钟，然后参照喂哺建议表，选出所需水量及奶粉量；
- 3、待开水冷却至45℃-55℃，将正确水量倒入奶瓶或奶杯中；
- 4、用专用量匙将正确量的奶粉加入到奶瓶或奶杯中，量取奶粉时请勿刻意压平；
- 5、盖紧奶嘴，然后摇匀。如果用杯冲调，可用搅拌法搅匀，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

注：每一平匙奶粉约为4.5克。

爱心提示

12个月以上的幼儿食用本产品时，须配合添加辅食。

• 请参阅喂哺建议表的冲调比例进行冲调，不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。

• 奶液放置时间超过一个小时应丢弃。

• 喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据宝宝的生长情况咨询医护人员酌情增减。

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。



贝乐羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 100g

食用方法



1. 在冲泡奶粉之前, 请洗净、擦干双手;
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
4. 将饮用水煮沸, 待冷却至45-55°C, 将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
5. 用本产品专用量匙, 参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
6. 搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡, 不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康。
请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁, 建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存, 避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧, 并于1个月内食用完, 开罐后请勿放入冰箱。



净含量: 100克

国食注字YP20230185

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.51	10.50
脂肪	g	1.19	24.50
亚油酸	g	0.18	3.80
α -亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	g	2.8	57.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	370
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α -TE	0.39	8.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	27	550
维生素B ₂	μg	29	600
维生素B ₆	μg	19.4	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.500
烟酸(烟酰胺)	μg	126	2600
叶酸	μg	3.7	77.0
泛酸	μg	121	2500
维生素C	mg	3.4	70.0
生物素	μg	0.73	15.00
胆碱	mg	6.3	130.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	430
铜	μg	18.2	375.0
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.15	3.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	1.55	32.00
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.6	95.0
氯	mg	15	315
硒	μg	0.92	19.00

可选择成分

牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
低聚半乳糖	g	0.011	0.230
低聚果糖	g	0.029	0.600
乳铁蛋白	mg	1.8	38.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	35.0

说明: 即食状态下, 每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素(维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、矿物质(氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚磷酸钠))

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商: 天津嘉仕美乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
曾用名: 云边有只羊
电话/传真: 022-58099599
网址: www.tjscinan.com
食品生产许可证编号: SC10512011617567
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状产品
产品标准代号: GB 10765-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线: 400-002-2188



贝乐羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 330g

食用方法



1. 在冲调奶粉之前, 请洗净、擦干双手;
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
4. 将饮用水煮沸, 待冷却至45-55°C, 将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
5. 用本产品专用量匙, 参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
6. 搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁, 建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存, 避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧, 并于1个月内食用完, 开罐后请勿放入冰箱。



净含量: 330克

国食注字YP20230185

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.51	10.50
脂肪	g	1.19	24.50
亚油酸	g	0.18	3.80
α -亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	g	2.8	57.0
维生素			
维生素A	μ g RE	18	370
维生素D	μ g	0.63	13.00
维生素E	mg α -TE	0.39	8.00
维生素K ₁	μ g	1.70	35.00
维生素B ₁	μ g	27	550
维生素B ₂	μ g	29	600
维生素B ₆	μ g	19.4	400.0
维生素B ₁₂	μ g	0.073	1.500
烟酸(烟酰胺)	μ g	126	2600
叶酸	μ g	3.7	77.0
泛酸	μ g	121	2500
维生素C	mg	3.4	70.0
生物素	μ g	0.73	15.00
胆碱	mg	6.3	130.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	430
铜	μ g	18.2	375.0
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.15	3.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μ g	1.55	32.00
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μ g	4.6	95.0
氯	mg	15	315
硒	μ g	0.92	19.00

可选择成分

牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
低聚半乳糖	g	0.011	0.230
低聚果糖	g	0.029	0.600
乳铁蛋白	mg	1.8	38.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	35.0

说明: 即食状态下, 每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素[维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质(氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商: 天津喜仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
曾用名: 云边有只羊
电话/传真: 022-58099599
网址: www.tjscin.com
食品生产许可证编号: SC10512011617567
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状产品
产品标准代号: GB 10765-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线: 400-002-2188



6 975413 970131

贝乐羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 600g

食用方法



- 1.在冲调奶粉之前,请洗净、擦干双手;
- 2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
- 3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
- 4.将饮用水煮沸,待冷却至45-55°C,将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
- 5.用本产品专用量匙,参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
- 6.搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调,不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康,请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量,可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁,建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存,避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱。



净含量:600克

国食注字YP20230185

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.51	10.50
脂肪	g	1.19	24.50
亚油酸	g	0.18	3.80
α-亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	g	2.8	57.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	370
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.39	8.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	27	550
维生素B ₂	μg	29	600
维生素B ₆	μg	19.4	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.500
烟酸(烟酰胺)	μg	126	2600
叶酸	μg	3.7	77.0
泛酸	μg	121	2500
维生素C	mg	3.4	70.0
生物素	μg	0.73	15.00
胆碱	mg	6.3	130.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	430
铜	μg	18.2	375.0
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.15	3.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	1.55	32.00
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.6	95.0
氯	mg	15	315
硒	μg	0.92	19.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
低聚半乳糖	g	0.011	0.230
低聚果糖	g	0.029	0.600
乳铁蛋白	mg	1.8	38.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	35.0

说明:即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素(维生素A(视黄醇)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱))、矿物质(氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:天津市
曾用名:云边有只羊
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjsclan.com
食品生产许可证编号:SC10512011617567
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状产品
产品标准代号:GB 10765-2021
保质期:24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线:400-002-2188



贝乐羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 800g

食用方法



- 1.在冲调奶粉之前,请洗净、擦干双手;
- 2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
- 3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
- 4.将饮用水煮沸,待冷却至45-55°C,将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
- 5.用本产品专用量匙,参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
- 6.搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调,不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康,请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量,可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁,建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存,避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱。



净含量:800克

国食注字YP20230185

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.51	10.50
脂肪	g	1.19	24.50
亚油酸	g	0.18	3.80
α -亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	g	2.8	57.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	370
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.39	8.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	27	550
维生素B ₂	μg	29	600
维生素B ₆	μg	19.4	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.500
烟酸(烟酰胺)	μg	126	2600
叶酸	μg	3.7	77.0
泛酸	μg	121	2500
维生素C	mg	3.4	70.0
生物素	μg	0.73	15.00
胆碱	mg	6.3	130.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	430
铜	μg	18.2	375.0
镁	μg	1.6	32.0
铁	mg	0.15	3.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	1.55	32.00
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.6	95.0
氯	mg	15	315
硒	μg	0.92	19.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
低聚半乳糖	g	0.011	0.230
低聚果糖	g	0.029	0.600
乳铁蛋白	mg	1.8	38.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	35.0

说明:即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂)、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素(维生素A(视黄醇)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱))、矿物质(氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)]

过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:天津市
曾用名:云边有只羊
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjsclan.com
食品生产许可证编号:SC10512011617567
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状产品
产品标准代号:GB 10765-2021
保质期:24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线:400-002-2188



贝乐羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 100g

食用方法



1. 在冲调奶粉之前, 请洗净、擦干双手;
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
4. 将饮用水煮沸, 待冷却至45-55℃, 将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
5. 用本产品专用量匙, 参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
6. 搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参考喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康。
请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

6-12月龄的较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁, 建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存, 避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧, 并于1个月内食用完。开罐后请勿放入冰箱。



净含量: 100克

国食注字YP20230186

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2024
蛋白质	g	0.67	13.50
脂肪	g	1.11	22.50
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	15	310
碳水化合物	g	2.8	56.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	465
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.40	8.00
维生素K ₁	μg	2.47	50.00
维生素B ₁	μg	32	650
维生素B ₂	μg	42	850
维生素B ₆	μg	19.8	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	173	3500
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	148	3000
维生素C	mg	3.7	75.0
生物素	μg	0.59	12.00
胆碱	mg	6.2	125.0
矿物质			
钠	mg	8	170
钾	mg	24	480
铜	μg	13.8	280.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	1.48	30.00
钙	mg	23	460
磷	mg	15	300
碘	μg	4.7	95.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.79	16.00

可选择成分

牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	110.0
低聚半乳糖	g	0.016	0.320
低聚果糖	g	0.044	0.900
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明: 即食状态下, 每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂)、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素(维生素A(维生素A)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱))、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)]

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商: 天津嘉仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
曾用名: 云边有只羊
电话/传真: 022-58099599
网址: www.tjcsinan.com
食品生产许可证编号: SC10512011617567
产品类型: 较大婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状产品
产品标准代号: GB 10766-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底码区)

咨询热线: 400-002-2188



贝乐羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 330g

食用方法



- 1、在冲调奶粉之前,请洗净、擦干双手;
- 2、清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
- 3、把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
- 4、将饮用水煮沸,待冷却至45-55°C,将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
- 5、用本产品专用量匙,参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
- 6、搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调,不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康,请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量,可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

6~12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁,建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存,避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱。



净含量:330克

国食注字YP20230186

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2024
蛋白质	g	0.67	13.50
脂肪	g	1.11	22.50
亚油酸	g	0.15	3.10
α -亚麻酸	mg	15	310
碳水化合物	g	2.8	56.0

维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	465
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.40	8.00
维生素K ₁	μg	2.47	50.00
维生素B ₁	μg	32	650
维生素B ₂	μg	42	850
维生素B ₆	μg	19.8	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	173	3500
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	148	3000
维生素C	mg	3.7	75.0
生物素	μg	0.59	12.00
胆碱	mg	6.2	125.0

矿物质			
钠	mg	8	170
钾	mg	24	480
铜	μg	13.8	280.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	1.48	30.00
钙	mg	23	460
磷	mg	15	300
碘	μg	4.7	95.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.79	16.00

可选择成分			
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	110.0
低聚半乳糖	g	0.016	0.320
低聚果糖	g	0.044	0.900
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明:即食状态下,每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质[硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠]

过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:天津市
曾用名:云边有只羊
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjscinan.com
食品生产许可证编号:SC10512011617567
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状产品
产品标准代号:GB 10766-2021
保质期:24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线:400-002-2188



6 975413 970148

贝乐羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 600g

食用方法



- 1、在冲调奶粉之前,请洗净、擦干双手;
- 2、清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
- 3、把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
- 4、将饮用水煮沸,待冷却至45-55°C,将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
- 5、用本产品专用量匙,参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
- 6、搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调,不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康,请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量,可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

6-12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁,建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存,避免太阳直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱。



净含量:600克

国食注字YP20230186

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2024
蛋白质	g	0.67	13.50
脂肪	g	1.11	22.50
亚油酸	g	0.15	3.10
α -亚麻酸	mg	15	310
碳水化合物	g	2.8	56.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	465
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.40	8.00
维生素K ₁	μg	2.47	50.00
维生素B ₁	μg	32	650
维生素B ₂	μg	42	850
维生素B ₆	μg	19.8	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	173	3500
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	148	3000
维生素C	mg	3.7	75.0
生物素	μg	0.59	12.00
胆碱	mg	6.2	125.0
矿物质			
钠	mg	8	170
钾	mg	24	480
铜	μg	13.8	280.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	1.48	30.00
钙	mg	23	460
磷	mg	15	300
碘	μg	4.7	95.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.79	16.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	110.0
低聚半乳糖	g	0.016	0.320
低聚果糖	g	0.044	0.900
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明:即食状态下,每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂)、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素E(维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)]、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:天津市
曾用名:云边有只羊
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjscinan.com
食品生产许可证编号:SC10512011617567
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状产品
产品标准代号:GB 10766-2021
保质期:24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线:400-002-2188



贝乐羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 800g

食用方法



- 1、在冲调奶粉之前,请洗净、擦干双手;
- 2、清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
- 3、把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
- 4、将饮用水煮沸,待冷却至45-55°C,将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
- 5、用本产品专用量匙,参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
- 6、搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调,不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康,请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量,可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

6~12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁,建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存,避免太阳直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱。



净含量:800克

国食注字YP20230186

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2024
蛋白质	g	0.67	13.50
脂肪	g	1.11	22.50
亚油酸	g	0.15	3.10
α -亚麻酸	mg	15	310
碳水化合物	g	2.8	56.0
维生素			
维生素A	μ g RE	23	465
维生素D	μ g	0.62	12.50
维生素E	mg α -TE	0.40	8.00
维生素K ₁	μ g	2.47	50.00
维生素B ₁	μ g	32	650
维生素B ₂	μ g	42	850
维生素B ₆	μ g	19.8	400.0
维生素B ₁₂	μ g	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μ g	173	3500
叶酸	μ g	3.0	60.0
泛酸	μ g	148	3000
维生素C	mg	3.7	75.0
生物素	μ g	0.59	12.00
胆碱	mg	6.2	125.0
矿物质			
钠	mg	8	170
钾	mg	24	480
铜	μ g	13.8	280.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μ g	1.48	30.00
钙	mg	23	460
磷	mg	15	300
碘	μ g	4.7	95.0
氯	mg	15	300
硒	μ g	0.79	16.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	110.0
低聚半乳糖	g	0.016	0.320
低聚果糖	g	0.044	0.900
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明:即食状态下,每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素E(维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:天津市
曾用名:云边有只羊
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjsecan.com
食品生产许可证编号:SC10512011617567
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状产品
产品标准代号:GB 10766-2021
保质期:24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线:400-002-2188



贝乐羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 100g

食用方法



1. 在冲调奶粉之前, 请洗净、擦干双手;
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
4. 将饮用水煮沸, 待冷却至45-55°C, 将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
5. 用本产品专用量匙, 参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
6. 搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参阅喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康。
请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据宝宝的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

12-36月龄的幼儿食用本产品时, 须配合添加辅食。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁, 建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存, 避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧, 并于1个月内食用完, 开罐后请勿放入冰箱。



净含量: 100克

国食注字YP20230187

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.72	14.50
脂肪	g	1.10	22.00
亚油酸	g	0.12	2.50
α-亚麻酸	mg	12	250
碳水化合物	g	2.7	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.42	8.50
维生素K ₁	μg	2.40	48.00
维生素B ₁	μg	35	700
维生素B ₂	μg	45	900
维生素B ₆	μg	20.0	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3750
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	4.0	80.0
生物素	μg	0.60	12.00
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	25	500
铜	μg	15.0	300.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
钙	mg	24	480
磷	mg	16	320
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.80	16.00
胆碱	mg	6.0	120.0
锰	μg	1.75	35.00
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(EPA/ARA)	mg	1.5	30.0
低聚半乳糖	g	0.032	0.650
低聚果糖	g	0.060	1.200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明: 即食状态下, 每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(菸酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商: 天津嘉仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
曾用名: 云边有只羊
电话/传真: 022-58099599
网址: www.tjscinan.com
食品生产许可证编号: SC10512011617567
产品类别: 幼儿配方食品
产品属性: 乳基粉状产品
产品标准代号: GB 10767-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线: 400-002-2188



贝乐羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 330g

食用方法



- 1、在冲调奶粉之前,请洗净、擦干双手;
- 2、清洗奶瓶/奶嘴、奶嘴及瓶盖;
- 3、把奶瓶/奶嘴放在沸水中至少煮5分钟;
- 4、将饮用水煮沸,待冷却至45-55°C,将正确水量倒入已消毒的奶瓶/奶嘴中;
- 5、用本产品专用量匙,参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
- 6、搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调,不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康,请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量,可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

12-36月龄的幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁,建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存,避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱。



净含量:330克

国食注字YP20230187

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.72	14.50
脂肪	g	1.10	22.00
亚油酸	g	0.12	2.50
α -亚麻酸	mg	12	250
碳水化合物	g	2.7	54.5
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	22	450
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α -TE	0.42	8.50
维生素K ₁	μg	2.40	48.00
维生素B ₁	μg	35	700
维生素B ₂	μg	45	900
维生素B ₆	μg	20.0	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3750
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	4.0	80.0
生物素	μg	0.60	12.00
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	25	500
铜	μg	15.0	300.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
钙	mg	24	480
磷	mg	16	320
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.80	16.00
胆碱	mg	6.0	120.0
锰	μg	1.75	35.00
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.5	30.0
低聚半乳糖	g	0.032	0.650
低聚果糖	g	0.060	1.200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明:即食状态下,每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂]、全脂羊奶粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素A(维生素A(醋酸视黄酯))、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)
过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地:天津市
曾用名:云边有只羊
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjscinan.com
食品生产许可证编号:SC10512011617567
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状产品
产品标准代号:GB 10767-2021
保质期:24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线:400-002-2188



6 975413 970155

贝乐羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 600g

食用方法



1. 在冲调奶粉之前, 请洗净、擦干双手;
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
4. 将饮用水煮沸, 待冷却至45-55°C, 将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
5. 用本产品专用量匙, 参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
6. 搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

12-36月龄的幼儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁, 建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存, 避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧, 并于1个月内食用完, 开罐后请勿放入冰箱。



净含量: 600克

国食注字YP20230187

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.72	14.50
脂肪	g	1.10	22.00
亚油酸	g	0.12	2.50
α-亚麻酸	mg	12	250
碳水化合物	g	2.7	54.5
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.42	8.50
维生素K ₁	μg	2.40	48.00
维生素B ₁	μg	35	700
维生素B ₂	μg	45	900
维生素B ₆	μg	20.0	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3750
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	4.0	80.0
生物素	μg	0.60	12.00
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	25	500
铜	μg	15.0	300.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
钙	mg	24	480
磷	mg	16	320
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.80	16.00
胆碱	mg	6.0	120.0
锰	μg	1.75	35.00
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.5	30.0
低聚半乳糖	g	0.032	0.650
低聚果糖	g	0.060	1.200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明: 即食状态下, 每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂)、全脂羊奶粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素E(维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)]

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商: 天津喜仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
曾用名: 云边有只羊
电话/传真: 022-58099599
网址: www.tjscinan.com
食品生产许可证编号: SC10512011617567
产品类别: 幼儿配方食品
产品属性: 乳基粉状产品
产品标准代号: GB 10767-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线: 400-002-2188



贝乐羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 800g

食用方法



1. 在冲调奶粉之前, 请洗净、擦干双手;
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴及瓶盖;
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟;
4. 将饮用水煮沸, 待冷却至45-55°C, 将正确水量倒入已消毒的奶杯/奶瓶中;
5. 用本产品专用量匙, 参照“喂哺建议表”加入正确份量奶粉;
6. 搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示

一平匙奶粉约为4.5克。
请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调, 不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康, 请勿随意改变奶液浓度。
奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量, 可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

特别提示

12-36月龄的幼儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。
产品溯源二维码(详见罐底)是公司特设的产品质量追溯措施。
如无产品溯源二维码或产品溯源二维码遭损毁, 建议消费者谨慎购买。

贮存条件

置于阴凉干燥处贮存, 避免阳光直射及高温。
开启后请务必将罐盖紧, 并于1个月内食用完, 开罐后请勿放入冰箱。



净含量: 800克

国食注字YP20230187

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.72	14.50
脂肪	g	1.10	22.00
亚油酸	g	0.12	2.50
α-亚麻酸	mg	12	250
碳水化合物	g	2.7	54.5
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.42	8.50
维生素K ₁	μg	2.40	48.00
维生素B ₁	μg	35	700
维生素B ₂	μg	45	900
维生素B ₆	μg	20.0	400.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3750
叶酸	μg	3.0	60.0
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	4.0	80.0
生物素	μg	0.60	12.00
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	25	500
铜	μg	15.0	300.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.35	7.00
锌	mg	0.17	3.50
钙	mg	24	480
磷	mg	16	320
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.80	16.00
胆碱	mg	6.0	120.0
锰	μg	1.75	35.00
牛磺酸	mg	1.6	32.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.5	30.0
低聚半乳糖	g	0.032	0.650
低聚果糖	g	0.060	1.200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.0

说明: 即食状态下, 每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂)、全脂羊奶粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、维生素E(维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)]

过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

企业信息

生产商: 天津喜仕莱乳业有限公司
地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地: 天津市
曾用名: 云边有只羊
电话/传真: 022-58099599
网址: www.tjscinan.com
食品生产许可证编号: SC10512011617567
产品类别: 幼儿配方食品
产品属性: 乳基粉状产品
产品标准代号: GB 10767-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

咨询热线: 400-002-2188



玺羊羊婴儿配方羊奶粉(0-6 月龄, 1 段) 100g

食用方法

1. 洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时。
2. 将水煮沸，冷却至40°C-60°C左右的温开水备用。
3. 将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
4. 用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示:对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示:每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调，不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商:天津喜仕莱乳业有限公司
地址:天津自贸试验区(空港经济区)
中环西路408号B区

客服热线:400-002-2188

产地:天津市
曾用名:玺纯®
电话/传真:022-58099599
网址:www.tjscinan.com
保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

6 975413 970018

玺羊羊

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

净含量:100克

国食注字YP20230188

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯)、全脂羊奶粉、乳糖、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种D-12、维生素(维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸亚铁、亚硒酸钠)

过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	矿物质			
蛋白质	g	0.51	10.60	钠	mg	8.9	185.0
脂肪	g	1.22	25.50	钾	mg	22	450
亚油酸	g	0.19	4.00	铜	μg	18.1	378.0
α-亚麻酸	mg	19	400	镁	mg	1.7	35.0
碳水化合物	g	2.7	56.0	铁	mg	0.13	2.80
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	18	380	锰	μg	2.16	45.00
维生素D	μg	0.62	13.00	钙	mg	15	315
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00	磷	mg	12	240
维生素K ₁	μg	1.68	35.00	碘	μg	4.6	95.0
维生素B ₁	μg	19	400	氯	mg	15	320
维生素B ₂	μg	26	550	硒	μg	0.91	19.00
维生素B ₆	μg	15.4	320.0	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.048	1,000	肌醇	mg	2.2	45.0
烟酸(烟酰胺)	μg	120	2500	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	80.0
叶酸	μg	3.7	78.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
泛酸	μg	134	2800	低聚半乳糖	g	0.012	0.250
维生素C	mg	3.6	75.0	低聚果糖	g	0.031	0.650
生物素	μg	0.58	12.00	1,3-二糖-2-糖苷(2-糖)	g	0.154	3.200
胆碱	mg	6.2	130.0	乳铁蛋白	mg	1.4	30.0

即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 330g

</

蜜羊羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 600g

1

2

3

4

5

食用方法

- 洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用。
- 将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。
- 将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
- 用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。
- 盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶液适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂奶次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：www.tjseincan.com
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

客服热线：400-002-2188

6 975413 970667

玺羊羊

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

净含量：600克
国食注字YP20230188

1段

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(DL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₉(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)]

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	矿物质			
蛋白质	g	0.51	10.60	钠	mg	8.9	185.0
脂肪	g	1.22	25.50	钾	mg	22	450
亚油酸	g	0.19	4.00	铜	μg	18.1	378.0
α-亚麻酸	mg	19	400	镁	mg	1.7	35.0
碳水化合物	g	2.7	56.0	铁	mg	0.13	2.80
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	18	380	锰	μg	2.16	45.00
维生素D	μg	0.62	13.00	钙	mg	15	315
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00	磷	mg	12	240
维生素K₁	μg	1.68	35.00	碘	μg	4.6	95.0
维生素B₁	μg	19	400	氯	mg	15	320
维生素B₂	μg	26	550	酒	μg	0.91	19.00
维生素B₃	μg	15.4	320.0	可选择成分			
维生素B₅	μg	0.048	1.000	肌醇	mg	2.2	45.0
维生素B₆	μg	120	2500	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	80.0
烟酸(烟酰胺)	μg	3.7	78.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
叶酸	μg	134	2800	低聚半乳糖	g	0.012	0.250
维生素C	mg	3.6	75.0	低聚果糖	g	0.031	0.650
生物素	μg	0.58	12.00	1,3-二糖-L-岩藻糖甘露糖	g	0.154	3.200
胆碱	mg	6.2	130.0	乳铁蛋白	mg	1.4	30.0

即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 800g

1

2

3

4

5

食用方法

- 洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用。
- 将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。
- 将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
- 用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。
- 盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶液适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂奶次数(次)
第1至2周	3	90	6
第3至4周	4	120	5
第2个月	5	150	5
第3至4个月	6	180	5
第5至6个月	7	210	5

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：www.tjsjinan.com
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

客服热线：400-002-2188

6 975413 970070

玺羊羊

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

净含量：800克
国食注字YP20230188

1段

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(DL-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₉(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、碘化钾、亚硒酸钠)]

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	矿物质			
蛋白质	g	0.51	10.60	钠	mg	8.9	185.0
脂肪	g	1.22	25.50	钾	mg	22	450
亚油酸	g	0.19	4.00	铜	μg	18.1	378.0
α-亚麻酸	mg	19	400	镁	mg	1.7	35.0
碳水化合物	g	2.7	56.0	铁	mg	0.13	2.80
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	18	380	锰	μg	2.16	45.00
维生素D	μg	0.62	13.00	钙	mg	15	315
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00	磷	mg	12	240
维生素K₁	μg	1.68	35.00	氯	mg	4.6	95.0
维生素B₁	μg	19	400	氮	mg	15	320
维生素B₂	μg	26	550	酒	μg	0.91	19.00
维生素B₃	μg	15.4	320.0	可选择成分			
维生素B₅	μg	0.048	1.000	肌醇	mg	2.2	45.0
维生素B₆	μg	120	2500	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	80.0
烟酸(烟酰胺)	μg	3.7	78.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.3	110.0
叶酸	μg	134	2800	低聚半乳糖	g	0.012	0.250
泛酸	mg	3.6	75.0	维生素C	g	0.031	0.650
生物素	mg	0.58	12.00	1,3-二糖-2-岩藻糖苷酶	g	0.154	3.200
胆碱	mg	6.2	130.0	乳铁蛋白	mg	1.4	30.0

即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 100g

</

蜜羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12 月龄, 2 段) 330g

</

玺羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12 月龄, 2 段) 600g

1、洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时。

2、将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。

3、将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

4、用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。

5、盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康。请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)
中环西路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：[www.tjscinan.com](#)
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
产品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

客服热线：400-002-2188

6 975413 970674

玺羊羊

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)

净含量：600克
国食注字YP20230189

2段

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Dbb-12、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(烟酰胺)、维生素B₅(泛酸)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、叶酸)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043	矿物质			
蛋白质	g	0.61	12.50	钠	mg	8	160
脂肪	g	1.15	23.50	钾	mg	22	450
亚油酸	g	0.15	3.00	钙	μg	12.7	260.0
α-亚麻酸	mg	15	300	镁	mg	2.0	40.0
碳水化合物	g	2.7	56.0	铜	mg	0.31	6.30
维生素				锌	μg	0.16	3.20
维生素A	μg RE	22	450	锰	μg	1.47	30.00
维生素D	μg	0.61	12.50	磷	mg	21	425
维生素E	mg α-TE	0.34	7.00	氯	mg	14	280
维生素K ₁	μg	1.57	32.00	碘	μg	4.7	95.0
维生素B ₁	μg	18	360	氮	mg	15	300
维生素B ₂	μg	24	500	硒	μg	0.59	12.00
维生素B ₆	μg	15.7	320.0	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.200	肌醇	mg	2.2	45.0
烟酸(烟酰胺)	μg	157	3200	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
叶酸	μg	3.2	65.0	二十碳五烯酸(EPA/ARA)	mg	5.4	110.0
泛酸	μg	122	2500	低聚半乳糖	g	0.016	0.320
维生素C	mg	3.1	63.0	低聚果糖	g	0.039	0.800
生物素	μg	0.69	14.00	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.147	3.000
胆碱	mg	6.1	125.0	乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

即食状态下，每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧，并于1个月内食用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 800g

1、洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用。

2、将水煮沸，冷却至40℃~60℃左右的温开水备用。

3、将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

4、用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。

5、盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第6个月	7	210	5
第7至12个月	7	210	4

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)
中环西路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：www.tjscinan.com
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

客服电话：400-002-2188

6 975413 970087

玺羊羊

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)

净含量：800克
国食注字YP20230189

2段

食用方法

1、洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用。

2、将水煮沸，冷却至40℃~60℃左右的温开水备用。

3、将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

4、用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。

5、盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物油调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、乳糖、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸亚铁、亚硒酸钠)]

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043	矿物质			
蛋白质	g	0.61	12.50	钠	mg	8	160
脂肪	g	1.15	23.50	钾	mg	22	450
亚油酸	g	0.15	3.00	铜	μg	12.7	260.0
α-亚麻酸	mg	15	300	镁	mg	2.0	40.0
碳水化合物	g	2.7	56.0	铁	mg	0.31	6.30
维生素A	μg RE	22	450	锌	mg	0.16	3.20
维生素E	μg	0.61	12.50	锰	μg	1.47	30.00
维生素D	mg α-TD	0.34	7.00	钙	mg	21	425
维生素K₁	μg	1.57	32.00	磷	mg	14	280
维生素B₁	μg	18	360	碘	μg	4.7	95.0
维生素B₂	μg	24	500	氯	mg	15	300
维生素B₃	μg	15.7	320.0	硒	μg	0.59	12.00
维生素B₅	μg	0.059	1.200	可选择成分			
烟酸(烟酰胺)	μg	157	3200	肌醇	mg	2.2	45.0
叶酸	μg	3.2	65.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
泛酸	μg	122	2500	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	110.0
维生素C	mg	3.1	63.0	低聚半乳糖	g	0.016	0.320
生物素	μg	0.69	14.00	低聚果糖	g	0.039	0.800
胆碱	mg	6.1	125.0	1,3-二糖-2-岩藻糖苷酶	g	0.147	3.000
				乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

即食状态下，每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧，并于1个月内食用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊幼儿配方羊奶粉(12-36 月龄, 3 段) 100g

食用方法

1. 洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时。
2. 将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。
3. 将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
4. 用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示:12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示:每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲调比例进行冲调，不恰当的冲调浓度不利于婴幼儿的健康。请勿随意改变奶液浓度，奶液放置时间超过一个小时应丢弃。喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商:天津善仕莱乳业有限公司
 地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
 产地:天津市
 曾用名:玺纯®
 电话/传真:022-58099599
 网址:www.tjscinan.com
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
 产品标准代号:GB 10767-2021
 食品生产许可证编号:SC10512011617567
 生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码)

客服热线:400-002-2188

玺羊羊 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

净含量:100克
 国食注字YP20230190

配料表

高油脱盐羊乳清粉(脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酯)、全脂羊奶粉、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸胆碱)、肌醇)、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、磷酸三钙、磷酸三钾、磷酸钾、亚硒酸钠)
 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017	钠	mg	8	160
蛋白质	g	0.67	13.50	钾	mg	22	450
脂肪	g	1.14	23.00	铜	μg	12.9	260.0
亚油酸	g	0.13	2.70	铁	mg	2.0	40.0
α-亚油酸	mg	12	250	锌	mg	0.31	6.30
碳水化合物	g	2.7	54.0	钙	mg	0.14	2.80
维生素				镁	mg	22	450
维生素A	μg RE	24	480	磷	mg	15	300
维生素D	μg	0.62	12.50	硒	μg	2.0	40.0
维生素E	mg α-TE	0.35	7.00	氯	mg	15	300
维生素K ₁	μg	1.59	32.00	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17	350	硒	μg	0.59	12.00
维生素B ₂	μg	25	500	胆碱	mg	6.2	125.0
维生素B ₆	μg	17.4	350.0	锰	μg	1.74	35.00
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.200	肌醇	mg	2.0	40.0
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.0
叶酸	μg	3.2	65.0	二十碳五烯酸(EPA/ARA)	mg	3.5	70.0
泛酸	μg	139	2800	低聚半乳糖	g	0.067	1.350
维生素C	mg	3.0	60.0	低聚果糖	g	0.050	1.000
生物素	μg	0.69	14.00	1,3-二油酸-2-甘油三酯	g	0.139	2.800
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

即食状态下,每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
 开启后请务必将罐盖紧,并于1个月内食用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊幼儿配方羊奶粉(12-36 月龄, 3 段) 330g

1

2

3

4

5

1. 洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时。

2. 将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。

3. 将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

4. 用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。

5. 盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)
中环西路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：www.tjscinan.com
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底喷码区)

客服热线：400-002-2188

6 975413 970063

玺羊羊

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量：330克
国食注字YP20230190

3段

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、低聚半乳糖(GOS)、低果聚糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(烟酰胺)、维生素B₅(泛酸)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸镁、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017	钠	mg	8	160
蛋白质	g	0.67	13.50	钾	mg	22	450
脂肪	g	1.14	23.00	铜	μg	12.9	260.0
亚油酸	g	0.13	2.70	镁	mg	2.0	40.0
α-亚麻酸	mg	12	250	铁	mg	0.31	6.30
碳水化合物	g	2.7	54.0	锌	mg	0.14	2.80
维生素				钙	mg	22	450
维生素A	μg RE	24	480	磷	mg	15	300
维生素D	μg	0.62	12.50	碘	μg	2.0	40.0
维生素E	mg α-TE	0.35	7.00	氯	mg	15	300
维生素K ₁	μg	1.59	32.00	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17	350	硒	μg	0.59	12.00
维生素B ₂	μg	25	500	胆碱	mg	6.2	125.0
维生素B ₆	μg	17.4	350.0	锰	μg	1.74	35.00
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.200	肌醇	mg	2.0	40.0
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.0
叶酸	μg	3.2	65.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.5	70.0
泛酸	μg	139	2800	低聚半乳糖	g	0.067	1.350
维生素C	mg	3.0	60.0	低果聚糖	g	0.050	1.000
生物素	μg	0.69	14.00	1,3-二噻吩-β-D-葡萄糖苷	g	0.139	2.800
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧，并于1个月内食用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊幼儿配方羊奶粉(12-36 月龄, 3 段) 600g

1、洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用。

2、将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。

3、将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

4、用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。

5、盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：[www.tjscinan.com](#)
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底二维码)

客服热线：400-002-2188



6 975413 970681

玺羊羊

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量：600克
国食注字YP20230190

3段

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸吡哆醇)、维生素B₅(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017	钠	mg	8	160
蛋白质	g	0.67	13.50	钾	mg	22	450
脂肪	g	1.14	23.00	铜	μg	12.9	260.0
亚油酸	g	0.13	2.70	镁	mg	2.0	40.0
α-亚麻酸	mg	12	250	铁	mg	0.31	6.30
碳水化合物	g	2.7	54.0	锌	mg	0.14	2.80
维生素				钙	mg	22	450
维生素A	μg RE	24	480	磷	mg	15	300
维生素E	μg	0.62	12.50	碘	μg	2.0	40.0
维生素K ₁	mg α-TE	0.35	7.00	氯	mg	15	300
维生素B ₁	μg	1.59	32.00	可选择成分			
维生素B ₂	μg	17	350	酒	μg	0.59	12.00
维生素B ₃	μg	25	500	胆碱	μg	6.2	125.0
维生素B ₅	μg	17.4	350.0	锰	μg	1.74	35.00
维生素B ₆	μg	0.059	1.200	肌醇	mg	2.0	40.0
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.0
叶酸	μg	3.2	65.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.5	70.0
泛酸	μg	139	2800	低聚半乳糖	g	0.067	1.350
维生素C	mg	3.0	60.0	低聚果糖	g	0.050	1.000
生物素	μg	0.69	14.00	1,3-二糖-2-有葡萄糖苷类	g	0.139	2.800
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧，并于1个月内食用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

蜜羊羊幼儿配方羊奶粉(12-36 月龄, 3 段) 800g

1、洗净调奶的用具，冲净后放入水中煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用。

2、将水煮沸，冷却至40℃-60℃左右的温开水备用。

3、将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

4、用量匙取粉时自然刮平(约4.5克)，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中。

5、盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中(将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度)，方可食用。

特别提示：12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺建议表

月龄	奶粉用量(平匙)	温开水用量(毫升)	每天喂哺次数(次)
第12至36个月	7	210	2-3

温馨提示：每一平匙奶粉约为4.5克。请参照喂哺建议表的冲泡比例进行冲泡，不恰当的冲泡浓度不利于婴幼儿的健康，请勿随意改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。
喂哺建议表是推荐喂哺量，可根据婴幼儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

企业信息

生产商：天津喜仕莱乳业有限公司
地址：天津自贸试验区(空港经济区)
中环西路408号B区
产地：天津市
曾用名：玺纯®
电话/传真：022-58099599
网址：www.tjscinan.com
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10512011617567
生产日期、保质期、批号及溯源信息(见罐底二维码)

客服电话：400-002-2188

6 975413 970094

蜜羊羊

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量：800克
国食注字YP20230190

3段

配料表

高油脱盐羊乳清粉[脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊奶粉、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸吡哆醇)、维生素B₅(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、肌醇、矿物质(硫酸铜、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)]

过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017	钠	mg	8	160
蛋白质	g	0.67	13.50	钾	mg	22	450
脂肪	g	1.14	23.00	铜	μg	12.9	260.0
亚油酸	g	0.13	2.70	镁	mg	2.0	40.0
α-亚麻酸	mg	12	250	铁	mg	0.31	6.30
碳水化合物	g	2.7	54.0	锌	mg	0.14	2.80
维生素				钙	mg	22	450
维生素A	μg RE	24	480	磷	mg	15	300
维生素E	μg α-TE	0.62	12.50	碘	μg	2.0	40.0
维生素K ₁	μg	0.35	7.00	氯	mg	15	300
维生素B ₁	μg	1.59	32.00	可选择成分			
维生素B ₂	μg	17	350	酒	μg	0.59	12.00
维生素B ₃	μg	25	500	胆碱	μg	6.2	125.0
维生素B ₅	μg	17.4	350.0	锰	μg	1.74	35.00
维生素B ₆	μg	0.059	1.200	肌醇	mg	2.0	40.0
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.0
叶酸	μg	3.2	65.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.5	70.0
泛酸	μg	139	2800	低聚半乳糖	g	0.067	1.350
维生素C	mg	3.0	60.0	低聚果糖	g	0.050	1.000
生物素	μg	0.69	14.00	1,3-二糖-2-有酮糖甘油脂	g	0.139	2.800
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉约13.5g。

贮存条件

置于阴凉、干燥处贮存。
开启后请务必将罐盖紧，并于1个月内食用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。